

Utipro[®]

PLUS CE

Prospect

Scopul utilizării

Compusul este destinat controlului și prevenirii infecțiilor tractului urinar produse de agenți patogeni, precum *E. coli* și alte bacterii gram (-) implicate în mod normal în etiologia infecțiilor tractului urinar.

Compusul, pe bază de gelatină și xiloglucan (hemiceluloză), acționează mecanic în lumenul intestinal, evitând contactului agenților patogeni cu mucoasa intestinală, contact care este primul pas în proliferarea acestora și trecerea ulterioară în tractul urinar.

Compusul se administrează pe cale orală, de la apariția primelor simptome de tulburări ale tractului urinar, cu scopul de a reduce proliferarea agenților patogeni care poate degenera în infecții. În caz de recidive ale infecțiilor, compusul este destinat și prevenirii unor noi episoade, în care proliferarea agenților patogeni cauzează repetarea infectării tractului urinar.

Prezentare

Compusul este prezentat sub formă de capsule, ambalate într-un blister.

Compoziție

Comparație de gelatină și xiloglucan (hemiceluloză), propolis, *Hibiscus sabdariffa*, dioxid de siliciu, stearat de magneziu, amidon de porumb.

Doze

Compusul trebuie administrat pe cale orală: 2 capsule per zi timp de 5 zile, în cazul pacienților care manifestă primele simptome de disconfort urinar, și, 1 capsulă per zi timp de cel puțin 15 zile consecutive per lună, pentru prevenirea recidivei (dacă este necesar, produsul poate fi administrat în cicluri repetate).

Instrucțiuni de utilizare

A se înghiți capsula cu apă.

Avertismente

- Diagnosticarea unei infecții a tractului urinar trebuie făcută de către un profesionist din cadrul sistemului de asistență medicală. Vă recomandăm, prin urmare, să consultați personalul medical în caz de îndoieli cu privire la diagnostic, în caz de simptome severe, cum ar fi febră mare, în cazul în care vârsta dumneavoastră este sub 14 ani sau dacă aveți alte boli sau prezența factori de risc.
- O infecție acută a tractului urinar poate necesita un tratament farmacologic cu un antibiotic. Compusul nu este un antibiotic, neavând nici efect bactericid, nici efect bacteriostatic împotriva agenților patogeni și, prin urmare, acesta nu va substitui un tratament recomandat de către un profesionist din cadrul sistemului de asistență medicală. În cazul în care este necesar un tratament antibiotic, compusul poate fi administrat concomitent cu acesta.

- Chiar dacă nu se cunosc efecte secundare, nu trebuie să utilizați acest produs în primele luni de sarcină sau în timpul alăptării. În astfel de cazuri, consultați-vă mai întâi medicul.
- A nu se utiliza compusul după data de expirare înscrisă pe ambalaj.
- A nu se utiliza capsulele în cazul în care blister-ul este deschis sau deteriorat.
- A se depozita la temperatura camerei, într-un loc uscat, departe de surse de căldură.
- A nu se congela.
- A nu se lăsa produsul la îndemâna copiilor.

Contraindicații și efecte secundare

Compusul nu trebuie utilizat în cazul pacienților cu hipersensibilitate cunoscută la gelatină sau la oricare dintre celelalte componente ale compusului.

Distribuitor: Pharm.Fabrik Montavit Ges.m.b.H Reprezentanța pentru România,
Str.Poet Andrei Mureșanu nr.5,Sect.1, apt.1,București
Tel/Fax.+4021.230.33.51, Office@montavit.ro

NOVINTETHICAL PHARMA SA
Via Pian Scaiolo, 11
6915 Lugano – Switzerland [Elveția]